

Staudenmischung

Blütensaum Veitshöchheim

Standort Sonnig-halbschattig, mässig trockener Boden

Charakteristik Attraktive und abwechslungsreiche Aspekte hauptsächlich von Mai bis September;
die Hauptfarben sind Gelb, Blau und Weiss; überwiegend niedrig wachsende Arten


Name	Anz./10 m ²	Blütenfarbe	Höhe (cm)
Leitstauden (Gerüstbildner)			
Aster divaricatus (Waldaster)	5	weiss	60-70
Aster frikartii 'Mönch' (Sommeraster)	5	blau	80
Begleitstauden (Gruppenstauden)			
Anemone sylvestris (Waldwindröschen, Waldanemone)	6	weiss	30-40
Buphthalmum salicifolium (Ochsenauge)	6	gelb	40-50
Geranium 'Philippe Vapelle' (Storchschnabel)	10	fliederfarben	40-50
Hemerocallis 'Stella de Oro' (Taglilie)	6	goldgelb	30-40
Heuchera micrantha 'Palace Purple' (Purpurglöckchen)	6	weiss	30-50
Luzula nivea (Schneemarbel)	10	weiss	20-40
Bodendeckerstauden			
Centaurea hypoleuca 'John Coutts' (Flockenblume)	12	rosa	50-60
Geranium sanguineum striatum (Storchenschnabel)	10	hellrosa	40
Viola sororia 'Freckles' (Veilchen)	10	weiss/violett	15
Waldsteinia geoides (Golderdbeere)	10	gelb	20-25
Blumenzwiebeln (Geophyten)			
Anemone blanda 'White Splendour' (Anemone)	36	weiss	10-15
Crocus tommasinianus (Krokus)	24	kobaltblau	10
Eranthis hyemalis (Winterling)	36	gelb	10
Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom' (Narzisse)	24	gelb	40



Aster divaricatus



Aster frikartii 'Mönch'



Anemone sylvestris



Bupthalmum salicifolium




Geranium 'Philippe Vapelle'



Hemerocallis 'Stella de Oro'



Heuchera micrantha
'Palace Purple'




Luzula nivea



Centaurea hypoleuca
'John Coutts'




Geranium sanguineum
striatum



Viola sororia 'Freckles'



Waldsteinia geoides



Anemone blanda
'White Splendour'



Eranthis hyemalis