

Staudenmischung

Blütensaum einheimisch


Standort Sonnig–halbschattig; trockener Boden
Charakteristik Dezente Farbkombination mit Hauptblüte im Frühjahr und Frühsommer;
 abwechslungsreiche Laubtexturen und unterschiedliche Wuchsformen

Name	Anz./10 m ²	Blütenfarbe	Höhe (cm)
Leitstauden (Gerüstbildner)			
Helleborus foetidus (Palmblattnieswurz)	2	hellgrün	40–50
Molinia arundinacea (Rohrpfeifengras)	3	grünlich	60–180
Tanacetum corymbosum (Straussblütige Margerite)	3	weiss	60–150

Begleitstauden (Gruppenstauden)			
Agrimonia eupatoria (Gemeiner Odermennig)	5	gelb	50–80
Bupthalmum salicifolium (Ochsenauge)	10	gelb	40–50
Campanula rapunculoides (Ackerglockenblume)	5	blauviolett	80–130
Campanula persicifolia (Pfersichblättrige Glockenblume)	10	hellblau	70

Bodendeckerstauden			
Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	10	violettblau	15–20
Anemone sylvestris (Waldwindröschen, Waldanemone)	10	weiss	30–40
Geranium sanguineum (Blutroter Storchschnabel)	5	violettrot	30
Prunella grandiflora (Grossblütige Brunelle)	5	blauviolett	20
Viola odorata (Duftveilchen)	15	blau-violett	15

Blumenzwiebeln (Geophyten)			
Anemone nemorosa (Buschwindröschen)	30	weiss	10–15
Corydalis solida (Festknolliger Lerchensporn)	100	violettrot	10–25
Eranthis hyemalis (Winterling)	50	gelb	10



Tanacetum corymbosum



Bupthalmum salicifolium



Anemone sylvestris



Eranthis hyemalis